علاجيات

محمد صالح فوزان الشمري

١٤٣٨هـ

مضادات الميكروبات

الاسم التجاري: بن سترب

المادة الفعالة : بنسلين +ستربتومايسين

Dyhydrostreptomycin sulfat+ penicillin

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام : واسع الطيف



ستربتومايسين

(يؤثر على البكتيريا السالبة لصبغة جرام)

بنسلين

(يؤثر على البكتيريا السالبة لصبغة جرام



الاسم التجاري:بن إسترب ط.م pen strep LA

المادة الفعالة :

بروكاين بنزيل بنسيلن procain Benzylpenicillin

بنزاثين بنزيل بنسيلين Benzathin Benzylpenicillin

داي هايدروستربتوميسن Dihydrostreptomycin

بروكايين هايدروكلوريد Procainhydrochlorid

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :واسع الطيف





الاسم التجاري:سترب بن strep pen

المادة الفعالة :بروكايين بنسيلين procaine penicillin

ستربتومايسين سلفيت streptomycin sulphate

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :واسع الطيف





الاسم التجاري:بن سترب ٢٠/٢٠ PEN STREP 20\20

المادة الفعالة :

بروكايين بنزيل بنسيلين Procaine benzylpenicillin

داي هيدروستربتومايسن Dihydrostreptomycin

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :واسع الطيف





الاسم التجاري:أموكس إنجكت Amoxinject

المادة الفعالة : Amoxicillin أموكسي سيللين

طريقة الإعطاء : حقن (عضل)

الإستخدام : واسع الطيف

الأسم التجاري:ملتي جيكت عصار MULTIJECT IMM



المادة الفعالة :

بروكايين بنسيلين ج Procaine Penicillin G

ستربتومايسين سيلفيت Streptomycin Sulphate

نيوميسين سيلفيت Neomycin sulphate

بريدنسولون Prednisolone



طريقة الإعطاء :

الإستخدام :واسع الطيف

إلتهاب الضرع

إلتهاب العيون





الاسم التجاري:
أوبتي كلوكس مرهم عين OPTICLOX EYE OINTMENT

المادة الفعالة : كلوكساسلين Cloxacillin

طريقة الإعطاء :على العين

الإستخدام :واسع الطيف

إلتهاب العين



الاسم التجاري: ملتيماست MULTIMAST

المادة الفعالة : نيوميسين سلفيت Neomycin sulphat

بروكاين بنسيلين Procaine Penicilline

أوكسي تتراسيكلين Oxytetracycline

الجرعة :

طريقة الإعطاء : موضعي

الإستخدام : واسع الطيف

إلتهاب الضرع

إلتهاب العيون



الاسم التجاري: ألميسين

المادة الفعالة : أوكسي تتراسيكلين
Oxytetracycline

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام : واسع الطيف

يؤثر على الأنابلازما والثيليريا في بداية العدوى





الاسم التجاري:أوكسي كيل Oxykel

المادة الفعالة :أوكسي تتراسيكين Oxytetracycline

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :واسع الطيف

يؤثر على الأنابلازما والثيليريا في بداية العدوى



الاسم التجاري:تيراميسين Terramycin LA

المادة الفعالة :أوكسي تتراسيكلين Oxytetracycline

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام : واسع الطيف

يؤثر على الأنابلازما والثيليريا في بداية العدوى



الاسم التجاري: Terramycin تيراميسين

المادة الفعالة: Oxytetracycline أوكسيتتراسيكلين

طريقة الإعطاء: حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام : واسع الطيف

يؤثر على الأنابلازما والثيليريا في بداية العدوى



الاسم التجاري: Tenaline LA تينالين

المادة الفعالة : Oxytetracycline أوكسي تتراسيكلين

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :واسع الطيف

يؤثر على الأنابلازما والثيليريا في بداية العدوى



الاسم التجاري:إنتيرترم intertrim LA

المادة الفعالة : سلفادوكسين Sulphadoxine

تراي ميثوبريم Trimethoprim

طريقة الإعطاء :حقن (عضل ,وريد,تحت الجلد)

الإستخدام : ١- واسع الطيف

٢- عدوى الكوكسيديا



الاسم التجاري: نوردين Norodine

المادة الفعالة : سلفاديازين Sulphadiazine
تريميثوبريم Trimethoprim

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد أو تحت الجلد)

الإستخدام : ١- واسع الطيف

٢- عدوى الكوكسيديا



الاسم التجاري: سول جات SULJAT 100

المادة الفعالة :

سلفاديمادين صوديوم Sulphdimedin sodium

طريقة الإعطاء :مع ماء الشرب

الإستخدام : ١- واسع الطيف

٢- عدوى الكوكسيديا



الاسم التجاري:INECTIL إنيكتل

المادة الفعالة : Tylosin تيلوسين

طريقة الإعطاء :حقن(عضل) أو تحت الجلد

الإستخدام : Narrow spectrum يؤثر على البكتيريا موجبة صبغة الجرام والميكوبلازما الإلتهاب الرئوي الذي يسببه الميكوبلازما





الاسم التجاري: تيلوريت إنج TYLORATE inj

المادة الفعالة : تيلوسين Tylosin

ليدوكايين Lidocaine

طريقة الإعطاء :

حقن (عضل)أو تحت الجلد

الإستخدام : Narrow spectrum يؤثر على

البكتيريا موجبة صبغة الجرام والميكوبلازما

الإلتهاب الرئوي الذي يسببه الميكوبلازما



الاسم التجاري:تيلوكيل.٢٠ TYLOKEL 20

المادة الفعالة :تيلوسين TYLOSIN

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)أو تحت الجلد

الإستخدام : Narrow spectrum يؤثر على

البكتيريا موجبة صبغة الجرام والميكوبلازما

الإلتهاب الرئوي الذي يسببه الميكوبلازما



الاسم التجاري:تيلوريت TYLORATE

المادة الفعالة :تيلوزين Tylosin

طريقة الإعطاء : حقن (عضل)أو تحت الجلد

الإستخدام : يؤثر على

البكتيريا موجبة صبغة الجرام والميكوبلازما

الإلتهاب الرئوي الذي يسببه الميكوبلازما





الاسم التجاري:جينداين ٦٠٠ GENDIAN

المادة الفعالة :جنتاميسين Gentamicin

طريقة الإعطاء :

حقن (عضل أو وريديا ببطء)

الإستخدام :واسع الطيف

يجب أن لاتزيد جرعة الجنتاميسين عن سبعة أيام خوفا من
توقف عضلات التنفس وفي هذه الحاله يستخدم الكالسيوم بالحقن ، كما
يمكن إستخدام الفيوستجمين أو النيوستجمين



الاسم التجاري:جنتاميسين ٥٠ Gentamicin

المادة الفعالة :جنتاميسين Gentamicin

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :واسع الطيف

يجب أن لاتزيد جرعة الجنتاميسين عن سبعة أيام خوفا من حدوث توقف عضلات التنفس وفي هذه الحاله يستخدم الكالسيوم بالحقن ، كما يمكن إستخدام الفيوستجمين أو النيوستجمين



الاسم التجاري:فلوكساد ١٠ FLOXAD

المادة الفعالة :إنروفلوكساسين Enrofloxacin

طريقة الإعطاء :حقن (عضل أو تحت الجلد)

الإستخدام :واسع الطيف





الاسم التجاري:سيفاليسين أرجوس ٢٠

CEFALEXINA ARGOS 20

المادة الفعالة :سيفالوكسين مونوهيدريت

Cephalexin monohydrate

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام : واسع الطيف



الاسم التجاري:يفيفينيكول UVEFENICOL

المادة الفعالة :فلورفينيكول Florfenicol

طريقة الإعطاء :حقن

الإستخدام :واسع الطيف







الاسم التجاري:نيفلور Nuflor

المادة الفعالة :فلورفيناكول FLORFENICOL

طريقة الإعطاء :

حقن (عضل) ويكرر بعد 48 ساعة

الإستخدام :واسع الطيف





الاسم التجاري:سبكتين Spectin

المادة الفعالة :

سبكتينومايسن spectinomycin

طريقة الإعطاء : بالفم

الإستخدام :

الإسهال في الحيوانات الصغيرة

مضادات الطفيليات



الاسم التجاري: ألبندكس

المادة الفعالة :ألبندازول Albendazol

طريقة الإعطاء :بالفم

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية الطور البالغ

مضاد للديدان الكبدية

مضاد للديدان الشريطية



الاسم التجاري:ألبندازول ALBENDAZOLE 5%

المادة الفعالة :ألبندازول ALBENDAZOLE

طريقة الإعطاء :بالفم

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية

مضاد للديدان الكبدية

مضاد للديدان الشريطية

الطور البالغ





الاسم التجاري:البنزول Albenzole 25

المادة الفعالة :ألبندازول Albendazol

طريقة الإعطاء :بالفم

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية

مضاد للديدان الكبدية

مضاد للديدان الشريطية

الطور البالغ



الاسم التجاري:ألبيفيت Albevet

المادة الفعالة :البندازول Albendazol

طريقة الإعطاء :بالفم

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية

مضاد للديدان الكبدية

مضاد للديدان الشريطية

الطور البالغ



الاسم التجاري: آيفومك سوبر INOMEC super

المادة الفعالة : إيفرمكتين ivermectine

كلورسالون clorsulon

طريقة الإعطاء : حقن (تحت الجلد)

الإستخدام :

مضاد للديدان الكبدية البالغة وغير البالغة

مضاد للديدان الإسطوانية البالغة

مضاد للديدان الشريطية البالغة

مضاد للطفيليات الخارجية (قراد,جرب.....)



الاسم التجاري:نورمكتين Normectin

المادة الفعالة :آيفرمكتين Ivermectine

طريقة الإعطاء :حقن (تحت الجلد)

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية البالغة

مضاد للديدان الشريطية البالغة

مضاد للطفيليات الخارجية (قراد,جرب.....)



الاسم التجاري:دكتوماكس DECTOMAX

المادة الفعالة :دورامكتين Doramectin

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :

مضاد للديدان الإسطوانية البالغة

مضاد للديدان الشريطية البالغة

مضاد للطفيليات الخارجية (قراد,جرب.....)

الاسم التجاري:بروموكتين بلس Promectin Plus
المادة الفعالة :أبامكتين ABAMECTIN
برازوكونتيل PRAZIQUANTEL

طريقة الإعطاء :بالفم

الإستخدام :مضاد للديدان الإسطوانية والشريطية والطفيليات الخارجية





الاسم التجاري:ترايكوين-س TRIQUIN-S

المادة الفعالة :كوينابيرامين QUINAPYRAMINE

طريقة الإعطاء :حقن (تحت الجلد)

الإستخدام :

علاج التريبانوسوما





الأسم التجاري:ترايكوين TRIQUIN

المادة الفعالة :

كوينابيرامين سلفيت Quinapyramine Sulphate

كوينابيرامين كلورايد Quinapyramine Chloride

طريقة الإعطاء :حقن(تحت الجلد)

الإستخدام :

علاج ووقاية من التريبانوسوما





الاسم التجاري:كوينامين QUINAMIN :

المادة الفعالة :

كوينابيرامين سلفيت Quinapyramine Sulphate

كوينابيرامين كلورايدQuinapyramine Chloride

طريقة الإعطاء : حقن(تحت الجلد)

الإستخدام :

علاج ووقاية من التريبانوسوما



الاسم التجاري:أميزول Imizol

المادة الفعالة : أميدوكارب Imidocarb

طريقة الإعطاء :حقن (عضل أو تحت الجلد)

الإستخدام :

علاج ووقاية من البابيزيا

علاج للأنابلازما ولكن بزيادة الجرعة (٥, ١مجم/كجم)



الاسم التجاري:بيوتلكس Butalex

المادة الفعالة : بيوبارفاكون Buparvaquone

طريقة الإعطاء :حقن (عضل)

الإستخدام :

علاج الثايليريا

المراهم والبخاخات

الاسم التجاري:مرهم أوكسيد الزنكZINC OXID OINTMENT
المادة الفعالة :أوكسيد الزنك Zinc oxide



طريقة الإعطاء :على الجلد

الإستخدام : ملطف في حالات الجروح الخفيفة إلتهاب الضرع فوق الحاد والحاد

الاسم التجاري: أدر-هيل مرهم UDDER –HEAL OINTMENT

المادة الفعالة :اليود



طريقة الإعطاء :على الجلد

الإستخدام : (الإلتهابات المزمنة)

إلتهاب المفاصل المزمن

إلتهاب الأوتار المزمن

إلتهاب العضلات المزمن

إلتهاب الضرع المزمن

الاسم التجاري:مرهم كبريت SULPHAR OINTEMINT
المادة الفعالة : الكبريت



طريقة الإعطاء :على الجلد

الإستخدام : علاج الجرب





الاسم التجاري:أستادون ASTIDON

المادة الفعالة : يود iodine

كحول Alcohol

طريقة الإعطاء :رش

الإستخدام : تطهير الجروح





الاسم التجاري:اوروندو سبري Orondo spray
المادة الفعالة :كلورتتراسيكلين chlortetracycline

طريقة الإعطاء :رش

الإستخدام :تطهير الجروح

مضادات الإلتهاب



الاسم التجاري:كولفاسون Colvasone

المادة الفعالة :ديكساميثازون صوديوم فوسفيت

Dexamethasone sodium phosphate

طريقة الإعطاء :حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :

مضاد للإلتهاب

مسكن للألم

خافض حرارة





الاسم التجاري:دايرازون Diurizone

المادة الفعالة :

هيدروكلوروتاسيد Hidroclorotiazida

ديكساميثازون Dexametasone

طريقة الإعطاء :حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :

مضاد للإلتهاب

مسكن للألم

خافض حرارة



الاسم التجاري:ديكسافينيل أرثريت Dexaphenylarthrite

المادة الفعالة : بنزيل بيوتازون phenylbutazone
ديكساميثازون Dexamethasone
بنزيل الكحول Benzyl alcohol
داصوديوم إديتيت Disodium edetate

طريقة الإعطاء :حقن(عضل أو وريد)

الإستخدام :

مضاد للإلتهاب

مسكن للألم

خافض حرارة





الاسم التجاري: ديكس DEXA 200

المادة الفعالة :

ديكساميثازون Dexamethasone

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :

مضاد للإلتهاب

مسكن للألم

خافض حرارة

مضادات الحساسية



الاسم التجاري: هستاكيور HISTACURE

المادة الفعالة :

دايفهيدرامين هيدروكلورايد Diphenhydramine hydrochloride

طريقة الإعطاء : حقن (عضل أو وريد)

الإستخدام :

مضاد حساسية

مضاد إلتهاب



الاسم التجاري:استيمك astemic

المادة الفعالة :

Chlorfeniramine maleate كلورفينارامين ماليت

طريقة الإعطاء :حقن

(عضل أو وريد أو تحت الجلد

الإستخدام :

مضاد حساسية

